



IMÁGENES EN DERMATOLOGÍA

[Artículo traducido] Hiperpigmentación del paladar duro: el resultado del uso de imatinib a largo plazo

The Pigmented Hard Palate: A Long Term Outcome of Imatinib

F. Mayo-Martínez*, C. Requena y B. Llombart

Department of Dermatology, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España

Una mujer caucásica de 71 años fue remitida para valorar una pigmentación solitaria y difusa, de color azul oscuro grisáceo en el paladar duro (fig. 1A). Su historial médico reveló un tumor estromal gastrointestinal de la vagina, tratado durante 15 años con mesilato de imatinib. No se observó ninguna otra lesión cutánea o mucosa. El examen histopatológico mostró depósitos de gránulos finos y marrones, tanto en los melanófagos como entre las fibras de colágeno en la lámina propia. El epitelio tenía un aspecto normal, sin evidencia de lesión melanocítica (fig. 1B). Estos hallazgos permitieron el diagnóstico de pigmentación mucosa inducida por imatinib. Las lesiones hiperpigmentadas orales y periorales constituyen un desafío diagnóstico, que pueden variar desde condiciones benignas, como la pigmentación inducida por fármacos, la melanosis del fumador, la mácula melanótica o el nevus melanocítico, hasta condiciones malignas como el melanoma de mucosa oral. La pigmentación oral inducida por imatinib es una reacción farmacológica relacionada con la exposición a largo plazo (de 5 a 6 años, rango de 3 meses a



Figura 1

13 años) que compromete predominantemente el paladar duro. Se manifiesta como una pigmentación macular azul grisácea difusa y simétrica. Microscópicamente, se observan depósitos de melanina y/o hemosiderina en la lámina propia, sin aumento de la pigmentación basal ni hiperplasia melanocítica. Al tratarse de un fenómeno poco descrito, conocer su presentación clínica es fundamental para su diagnóstico correcto.

Véase contenido relacionado en DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.ad.2023.08.025>

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mayomartinezf@gmail.com

(F. Mayo-Martínez).

<https://doi.org/10.1016/j.ad.2025.02.017>

0001-7310/© 2024 AEDV. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Cómo citar este artículo: F. Mayo-Martínez, C. Requena and B. Llombart, [Artículo traducido] Hiperpigmentación del paladar duro: el resultado del uso de imatinib a largo plazo, ACTAS Dermo-Sifiliográficas, <https://doi.org/10.1016/j.ad.2025.02.017>