

## John Templeton Bowen (1857-1940)

Rosa María Díaz Díaz, Susana Urrutia Hernando\* y Elena Vera Iglesias

Servicio de Dermatología. Hospital La Paz. Madrid. \*Servicio de Dermatología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

**Resumen.**—John T. Bowen nació en 1857 en Boston. Se doctoró en Medicina en la Universidad de Harvard en 1884. Durante tres años perfeccionó sus conocimientos médicos en varias ciudades europeas. Trabajó en el servicio de Dermatología del Hospital General de Massachusetts desde 1889 hasta 1914. Se le recuerda por la descripción de la neoplasia intraepidérmica que lleva su nombre. Murió en 1940.

**Palabras clave:** Bowen, historia.

Díaz Díaz RM, Urrutia Hernando S, Vera Iglesias E. John Templeton Bowen (1857-1940). *Actas Dermosifiliogr* 2002;93(8):524-5.

### JOHN TEMPLETON BOWEN (1857-1940)

**Abstract.**—John T. Bowen was born on 1857 in Boston. His degree of doctor of Medicine was granted at the Harvard Medical School in 1884. He studied in some European cities for three years. He was appointed physician for the Department of Diseases of the Skin to the Massachusetts General Hospital from 1889 to 1914. He is best remembered for his description of the cutaneous cancer that Bowen's name was attached. He died on 1940.

**Key words:** Bowen, history.

**Resumen.**—El histiocitoma fibroso aneurismático es una rara

John Templeton Bowen nació en Boston (Massachusetts) el 8 de julio de 1857 en el seno de una familia acomodada<sup>1</sup>. Se doctoró en Medicina en la Universidad de Harvard en 1884<sup>2</sup>. Durante tres años viajó por Europa estudiando en los hospitales más importantes de Berlín, Munich y Viena. Posiblemente fue durante su estancia europea cuando se interesó por la Dermatología<sup>3</sup>.

En mayo de 1889 comenzó a trabajar como médico ayudante en la consulta externa de Dermatología del Hospital General de Massachusetts, siendo entonces jefe de servicio el doctor James Clark White<sup>1</sup>. Permaneció como médico ayudante hasta 1895, fecha en la que se le nombra médico titular, ocupando dicho cargo hasta 1914 (fig. 1). Desde 1914 hasta 1927 fue médico consultor del Hospital Infantil.

A Bowen le gustaba la soledad, prefiriendo el silencio del estudio con el microscopio al bullicio de las consultas hospitalarias.

Nunca gozó de una salud buena, hecho que podría explicar el escaso número de sus publicaciones. En 1889 publicó un trabajo sobre histología cutánea, *The epithelial layer of the skin*<sup>3</sup>. Colaboró con artículos divulgativos acerca de las enfermedades cutáneas en varios proyectos de grandes enciclopedias<sup>4</sup>.

En 1912 apareció su trabajo más conocido, *Precancerous dermatosis: a study of two cases of chronic atypical epithelial proliferation*<sup>5, 6</sup>. En él reunió los casos de dos

JOSE GREGORIO ALVAREZ FERNANDEZ  
ANA PÉREZ CAMPOS



Fig. 1.—John Templeton Bowen (1857-1940).

pacientes con lesiones cutáneas muy parecidas morfológicamente, localizadas en uno de ellos en la nalga izquierda y en el otro en la pierna derecha, con una evolución tórpida y cuyas alteraciones histológicas recordaban al autor las observadas en la enfermedad de Paget y en otras dermatosis precancerosas.

Dos años después, Jean Darier le remitió una carta en la que, además de mandarle la foto y el caso clínico de una paciente con una lesión parecida a las que había publicado Bowen, le propuso que esta nueva

#### Correspondencia:

Rosa María Díaz Díaz. Servicio de Dermatología. Hospital La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

Aceptado el 20 de mayo de 2002.

dermatosis precancerosa se conociese con el epónimo de enfermedad de Bowen<sup>7</sup>. Al parecer, el estallido de la Primera Guerra Mundial impidió un encuentro entre los dos grandes dermatólogos.

En 1915 publicó dos nuevos artículos: uno<sup>8</sup> referido a un cuadro epidémico de alopecia en niñas en edad escolar, con características a caballo entre las de la alopecia areata y las de los cuadros de tricotilomanía; el otro<sup>9</sup> recogió un sexto paciente con una lesión cutánea similar a los que ya había descrito tres años antes.

Como docente se le nombró instructor en Dermatología de la Escuela Médica de Harvard en el año 1896. Desde 1907, coincidiendo con la jubilación del doctor White, y hasta 1911, ejerció como primer profesor Edward Wigglesworth de Dermatología. En 1912 pasó a ser profesor emérito.

Pasó los últimos años de su vida en su domicilio, aquejado de un cuadro vertiginoso incapacitante. Murió en el año 1940 en Boston.

## BIBLIOGRAFÍA

1. White CJ. John Templeton Bowen, M. D. (1857-1940). *Arch Derm Syph* 1941;43:386-8.
2. Graham-Little E. John Templeton Bowen. *Br J Derm Syph* 1941;53:190-1.
3. Parish LC. John Templeton Bowen. *Cutis* 1970;6:1165-73.
4. Bowen JT. Benign neoplasms. En: Stedman T, editor. *Twentieth century practice*. Vol. V. New York: Wm Wood; 1896. p. 646.
5. Bowen JT. Precancerous dermatosis: a study of two cases of chronic atypical epithelial proliferation. *J Cutan Dis Syph* 1912;30:241-55.
6. Corman ML. John Templeton Bowen (1857-1940). *Dis Colon Rectum* 1985;28:982-8.
7. Bernhard JD, Elliot AD. A letter from Darier to Bowen on the naming of Bowen's disease. *Arch Dermatol* 1983; 119:261-2.
8. Bowen JT. Epidemic alopecia in small areas. *Jour Cut Dis* 1915;33:343.
9. Bowen JT. Precancerous dermatoses. *Jour Cut Dis* 1915;33:787.