

Liquen estriado múltiple unilateral en un adulto

Sr. Director:

El liquen estriado es una dermatosis inflamatoria lineal adquirida que suele observarse en niños y sólo excepcionalmente en adultos. Clínicamente se caracteriza por pápulas dispuestas en bandas que siguen las líneas de Blaschko y habitualmente se localizan en una extremidad. También se han descrito casos en el tronco o en el área facial, así como formas múltiples unilaterales o bilaterales^{1,2}.

Un varón de 36 años de edad, con antecedentes personales de apendicectomía y tuberculosis ganglionar, consultó por lesiones poco pruriginosas, de 2 semanas de evolución, limitadas al lado izquierdo del tronco. No refería historia personal ni familiar de dermatitis atópica, psoriasis u otra dermatosis previa similar. En la exploración se apreciaron varias bandas de lesiones maculopapulosas, eritematosas, que adoptaban una morfología en «S» itálica siguiendo las líneas de Blaschko, localizadas en la región abdominal izquierda, el costado izquierdo y el brazo izquierdo, que se interrumpían de forma brusca en la línea media (fig. 1). Se realizó una biopsia, cuyo estudio histopatológico puso de manifiesto una epidermis con una discreta acantosis, papilomatosis y pequeños focos de paraqueratosis; en algunas zonas se apreció espongiosis y degeneración hidrópica de la capa basal. En la dermis se observó un infiltrado fundamentalmente linfocitario que se disponía en pequeños parches que afectaban la dermis papilar, alrededor de los folículos, y más profundamente de forma perivascular (fig. 2).

Se emplean términos como «dermatitis de Blaschko autolimitada, recidivante y adquirida», «la blaschkitis del adulto» o «la dermatitis blaschkoide adquirida» para describir una erupción similar al liquen estriado que ocurre en adultos³⁻⁸. Esta dermatosis se caracteriza por la afectación del tronco por papulovesículas dispuestas en múltiples líneas y una histopatología con predominio de dermatitis espongiótica⁹. Por el contrario, el liquen estriado suele presentarse en niños con lesiones papulosas dispuestas en una banda lineal única, localizada en las extremidades y con cambios histopatológicos liquenoides¹⁰.

En la actualidad existen menos de 25 casos descritos de liquen estriado en el adulto y de blaschkitis del adulto. Todos ellos presentan grandes semejanzas tanto clínicas como histopatológicas, lo que ha llevado a algunos autores a unificar estas dos entidades bajo el término «erupción inflamatoria cutánea adquirida sobre las líneas de Blaschko» (BLAISE)^{11,12}, y a otros, entre los que nos incluimos, a considerar a la blaschkitis del adulto dentro del liquen estriado¹³⁻¹⁵.



Fig. 1.—Lesiones papulosas siguiendo las líneas de Blaschko en costado izquierdo.




Fig. 2.—Infiltrado inflamatorio dispuesto de manera parcheada y perivascular en la dermis. (Hematoxilina-eosina, x10.)

BIBLIOGRAFÍA

1. Patrizi A, Neri I, Fiorentini C, Bonci A, Ricci G. Lichen striatus: clinical and laboratory features of 115 children. *Pediatr Dermatol*. 2004;21:197-204.
2. Peramiqel L, Baselga E, Krauel J, Palou J, Alomar A. Liquen estriado sistematizado bilateral. *Actas Dermosifiliogr*. 2004;95:126-8.
3. Grosshans E, Marot L. Blaschkite de l'adulte. *Ann Dermatol Venereol*. 1990;117:9-15.
4. Betti R, Vergani R, Gualandri L, Crosti C. Acquired self-healing Blaschko dermatitis in an adult. *Australas J Dermatol*. 1998;39:271-2.
5. Lipsker D, Cribier B, Girard-Lemaire F, Flori E, Grosshans E. Genetic mosaicism in an acquired inflammatory dermatosis following the lines of Blaschko. *Arch Dermatol*. 2000; 136:805-7.

6. Lipsker D, Stark J, Schneider GA. Blaschkolineäre Dermatitis im Erwachsenenalter (Morbus Grosshans-Marot) mit antinukleären Antikörpern. *Hautarzt*. 2000;51:774-7.
7. Bojanic P, Simovic I. Acquired Blaschko Dermatitis-seventh case. *Dermatol Online J*. 2003;9:12.
8. Hale EK. Acquired Blaschko Dermatitis. *Dermatol Online J*. 2002;7:8.
9. Grosshans EM. Acquired blaschkolinear dermatoses. *Am J Med Genet*. 1999;85:334-7.
10. Mallo García S, Escalonilla García-Patos P. Lesiones papulosas lineales en el abdomen. *Piel*. 2004;19:210-2.
11. Taieb A, El Youbi A, Grosshans E, Maleville J. Lichen striatus: A Blaschko linear acquired inflammatory skin eruption. *J Am Acad Dermatol*. 1991;25:637-42.
12. Ro YS, Shin YI. A case of lichen striatus following Blaschko lines. *Cutis*. 2001;67:31-2,34.
13. Michel JL, Wolf F, Fond L, Cambazard F. Lichen striatus de l'enfant et «blaschkites» de l'adulte. *Ann Dermatol Venerol*. 1997;124:187-91.
14. Reiter H, Feldmann R, Breier F, Happle R, Gschnait F. Lichen striatus oder Blaschkitis des Erwachsenen Variationen derselben Entität? *Hautarzt*. 2000;51:770-3.
15. Hofer T. Lichen striatus in adults or «adult blaschkitis»? There is no need for a new naming. *Dermatology*. 2003;207:89-92.

**Benigno Monteagudo^a, Carmen Paredes^b,
Manuel Vázquez^b, Carmela Pestoni^b,
María M. Used^c, Javier Labandeira^b
y Manuel Ginarte^b**

^aServicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Nova Santos. El Ferrol. España.

^bServicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario. Facultad de Medicina. Santiago de Compostela. España.

^cServicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Nova Santos. El Ferrol. España.