



ACTAS Derma-Sifiliográficas

Full English text available at
www.actasdermo.org



IMÁGENES EN DERMATOLOGÍA

Una complicación en dermatología, erupción variceliforme de Kaposi



Kaposi Varicelliform Eruption: A Dermatologic Complication

I. Pérez-López*, G. Blasco-Morente, A. Martínez-López y J. Tercedor-Sánchez

Unidad de Gestión Clínica de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

Paciente de 27 años de edad, con dermatitis atópica moderada-grave desde la infancia, y en tratamiento con corticoides tópicos, en el momento actual. Acudió al servicio de urgencias con una erupción pruriginosa generalizada de 2 días de evolución. No refería ningún síntoma de afectación sistémica. En la exploración destacaba la presencia de múltiples lesiones vesiculosas, algunas de ellas erosionadas y con costras en la superficie, que se localizaban en prácticamente toda la superficie corporal (figs. 1 y 2). Ante la sospecha de eccema herpético se pautó aciclovir 200 mg/4 h y cloxacilina 500 mg/6 h durante 7 días. El cultivo y la PCR de herpes simple tipo 1 resultaron positivos, por lo que se confirmó el diagnóstico de sospecha. Tres días después, las lesiones estaban en resolución.

La erupción variceliforme de Kaposi es una forma poco frecuente, diseminada y grave de herpes simple. Suele afectar a niños y adultos jóvenes, de entre 20 y 29 años, con dermatosis cutáneas, especialmente dermatitis atópica, aunque hay descritos casos en enfermedad de Darier, ictiosis vulgar, pénfigo, micosis fungoide, histiocitosis o dermatitis seborreica.



Figura 1



Figura 2

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ipl.elmadrono@hotmail.com

(I. Pérez-López).