



ACTAS Derma-Sifiliográficas

Full English text available at
www.actasdermo.org



IMÁGENES EN DERMATOLOGÍA

Lesión nodular erosiva en el pabellón auricular de una adolescente



Erosive Nodular Lesion in the Auricle of a Teenager's Ear

E. Garcia-Zamora^{a,*}, E. Naz-Villalba^a y F. Pinedo-Moraleda^b

^a Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España

^b Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España

Adolescente de 14 años, sin antecedentes de interés, con una lesión asintomática en hélix del pabellón auricular izquierdo de 2 meses de evolución. Había surgido durante el mes de agosto, y no se había modificado desde su aparición.

La exploración mostró una lesión nodular de 8 mm con bordes netos algo sobreelevados y centro erosionado (fig. 1A).

La biopsia mostró hiperplasia epidérmica, hiperqueratosis, acantosis e hipergranulosis, con nidos de células epitelioides no pigmentadas desde la epidermis hasta la dermis reticular. En la dermis papilar se identificaron glóbulos eosinófilos fibrilares correspondientes a los cuerpos de Kamino (fig. 1B).

Diagnosticada de *nevus* de Spitz, se extirpó la lesión, sin recidiva tras 2 años de seguimiento.

El *nevus* de Spitz es un tumor melanocítico benigno adquirido, que suele aparecer antes de los 20 años. Se manifiesta como una pápula solitaria asintomática, firme, bien delimitada y de coloración variable. Habitualmente se localiza en cabeza y cuello, extremidades inferiores y tronco. El diagnóstico diferencial incluye otros *nevus* melanocíticos,



Figura 1

hemangiomas, granuloma piogénico, molusco contagioso o queloides. La edad de nuestra paciente y la aparición durante el verano hicieron sospechar una leishmaniasis cutánea, descartándose una condrodermatitis nodular del hélix por la edad de la paciente.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: garciazamoraelena@gmail.com
(E. Garcia-Zamora).