

Journal Pre-proof

Nódulo de orf

P. López Sanz A. García Vázquez JL. Agudo Mena

PII: S0001-7310(24)01051-2


DOI: <https://doi.org/doi:10.1016/j.ad.2023.09.034>

Reference: AD 4211

To appear in: *Actas dermosifiliograficas*

Received Date: 5 August 2023

Accepted Date: 15 September 2023



Please cite this article as: López Sanz P, García Vázquez A, Agudo Mena J, Nódulo de orf, *Actas dermosifiliograficas* (2024), doi: <https://doi.org/10.1016/j.ad.2023.09.034>

This is a PDF file of an article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive version of record. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are providing this version to give early visibility of the article. Please note that, during the production process, errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

© 2024 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de AEDV.

Sección: Imágenes en Dermatología

-

- **Título (castellano e inglés):**

- Nódulo de orf.

- Orf virus nodule

P. López Sanz¹.

A. García Vázquez¹.

J. L. Agudo Mena¹.

1. Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario de Albacete. Albacete, España

1. Department of Dermatology. Hospital General Universitario de Albacete. Albacete, Spain.

-

-

-

- **Autor de correspondencia:** Pablo López Sanz. **E-mail:** lopezsanzpablo@gmail.com.

Una mujer de 52 años sana consultó por una lesión cutánea en el borde cubital de la mano izquierda de una semana de evolución. La lesión era de crecimiento rápido, discretamente pruriginosa y sin fiebre, antecedentes de traumatismo local ni otros síntomas asociados. Como antecedente laboral, destacaba la profesión de carnicera, en contacto principalmente con ganado ovino. A la exploración, destacaba una placa eritemato-edematosa de 3 centímetros, bien delimitada, discretamente infiltrada, con eritema perilesional y una pseudopústula central suprayacente (Fig. 1). También se objetivaron adenopatías axilares menores a 1 cm no dolorosas. En la biopsia de piel se observó un patrón de dermatitis perivascular superficial y profunda con abundantes eosinófilos y el cultivo tisular descartó la presencia de infección bacteriana, fúngica o por micobacterias. La lesión se resolvió a las 3 semanas sin necesidad de tratamiento ni cicatriz.

El nódulo de orf es una zoonosis causada por un virus del género Parapoxvirus que infecta principalmente ovejas y cabras. La mayoría de casos ocurren en profesiones de riesgo en contacto directo con animales infectados. Tras un periodo de incubación de 3-8 días, aparece una lesión que pasa por distintas fases (mácula, pápula, nódulo, vesícula y costra) para autorresolverse en 3-6 semanas. La lesión característica y los antecedentes de contacto con ganado ovino permitieron realizar este diagnóstico frente al nódulo de los ordeñadores, cuya clínica es indistinguible, pero aparece en personas en contacto con ganado bovino.



- **Figura:**

Journal Pre-proof