

Journal Pre-proof

Hipertrichosis adquirida tras un tatuaje de henna

A. Giacaman A. Martín-Santiago

PII: S0001-7310(25)00115-2

DOI: <https://doi.org/doi:10.1016/j.ad.2023.10.064>

Reference: AD 4285

To appear in: *Actas dermosifiliograficas*


Received Date: 27 September 2023

Accepted Date: 16 October 2023

Please cite this article as: Giacaman A, Martín-Santiago A, Hipertrichosis adquirida tras un tatuaje de henna, *Actas dermosifiliograficas* (2025), doi: <https://doi.org/10.1016/j.ad.2023.10.064>

This is a PDF file of an article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive version of record. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are providing this version to give early visibility of the article. Please note that, during the production process, errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

© 2025 AEDV. Publicado por Elsevier España, S.L.U.



Sección: Imágenes en Dermatología

Título: Hipertrichosis adquirida tras un tatuaje de henna

Title: Acquired hypertrichosis following a henna tattoo

Autores:

A. Giacaman¹, A. Martín-Santiago¹.

1. Departamento de Dermatología. Hospital Universitario Son Espases.

Correspondencia:

Dra. Aniza Giacaman,

E-mail: anizagiacaman@gmail.com


Un niño de 5 años consultó por una hipertrichosis de distribución geométrica en el brazo derecho de dos meses de evolución (fig. 1A). La lesión le había aparecido dos semanas después de pintarse un tatuaje de henna, durante las vacaciones de verano, y se hizo más evidente a medida que este perdía el color. No presentó eccema ni prurito. En la dermatoscopia se observó un aumento del número y diámetro de los vellos (fig. 1B).

La hipertrichosis es una reacción escasamente descrita tras el uso de tatuajes de henna, con una mayor frecuencia en los niños y en la gente joven. La causa es desconocida. En ocasiones se asocia a una dermatitis de contacto alérgica en relación con el uso de aditivos que se utilizan para hacer el tinte más oscuro y duradero en la piel. Sin embargo, también podría deberse a un efecto directo de

la henna sobre la piel, ya que hay casos de hipertrichosis en pacientes asintomáticos. La resolución de la hipertrichosis suele ocurrir a los 3-4 meses, sin mediar tratamiento.

Journal Pre-proof

Figura 1. A) Placa de hipertricosis con la forma de dos delfines en el área pintada con henna. B) En la dermatoscopia se observa un aumento del número y grosor de los vellos en la zona que estaba cubierta por el tatuaje, en comparación con la piel normal.



Journal Pre-proof