


Journal Pre-proof

Adenoma del pezón: utilidad de la dermatoscopia en su diagnóstico

M. Colmenero Sendra P. Gutiérrez Hernández J.B. Repiso Jiménez



PII: S0001-7310(25)00346-1

DOI: <https://doi.org/doi:10.1016/j.ad.2023.12.011>

Reference: AD 4366

To appear in: *Actas dermosifiliograficas*

Received Date: 18 September 2023

Accepted Date: 15 December 2023

Please cite this article as: Colmenero Sendra M, Gutiérrez Hernández P, Repiso Jiménez JB, Adenoma del pezón: utilidad de la dermatoscopia en su diagnóstico, *Actas dermosifiliograficas* (2025), doi: <https://doi.org/10.1016/j.ad.2023.12.011>

This is a PDF file of an article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive version of record. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are providing this version to give early visibility of the article. Please note that, during the production process, errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

© 2025 AEDV. Publicado por Elsevier España, S.L.U.

Sección: Imágenes en Dermatología

Adenoma del pezón: utilidad de la dermatoscopia en su diagnóstico.

Diagnosing nipple adenoma: the utility of dermoscopy.

M. Colmenero Sendra, P. Gutiérrez Hernández, J. B. Repiso Jiménez.

1. Servicio de Dermatología del Hospital Costa del Sol.
2. Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Costa del Sol.

Autor de correspondencia: María Colmenero Sendra (sendracolmenero@gmail.com)

Una mujer de 60 años fue remitida a dermatología por una lesión en el pezón izquierdo de dos meses de evolución. Clínicamente presentaba una tumoración nodular bien delimitada de 10 mm. A la dermatoscopia se observaron, sobre un fondo eritemato-violáceo (asterisco), unas estructuras vasculares regulares en la zona superior (flecha negra) y una región algodonosa amarillo-anaranjada en la región inferior (flecha roja). En la histología se demostró un nódulo tumoral dérmico con unas estructuras ductales sobre los conductos superficiales del pezón. Con estas características, el diagnóstico fue de un adenoma del pezón, un tumor benigno originado de los conductos galactóforos. Su reconocimiento clínico permite ayudar al diagnóstico diferencial con procesos malignos como la enfermedad de Paget (EP) o el carcinoma basocelular (CBC), en los que la dermatoscopia es una herramienta de apoyo diagnóstico. Se han descrito puntos rojos en disposición linear o semicircular correspondientes con las estructuras tubulares, unas áreas eritemato-violáceas subyacentes a las zonas de erosión epidérmica, unas estructuras vasculares regulares y lineales, que reflejan la vascularización tumoral y zonas amarillentas relacionadas con áreas hiperqueratósicas. La EP se caracteriza por una pigmentación difusa gris-azulada y vasos polimorfos irregulares. Las estructuras vasculares pueden confundir con el CBC, sin embargo, este tiene un aspecto perlado y suele ir acompañado de otros signos ausentes en el adenoma. En conclusión, la dermatoscopia puede ayudar a un diagnóstico más preciso, si bien es cierto que es necesario una confirmación histológica.

Fig.

