




# ACTAS Derma-Sifiliográficas

Full English text available at  
www.actasdermo.org



## IMÁGENES EN DERMATOLOGÍA

### Cuerno cutáneo en labio superior



### Cutaneous Horn on the Upper Lip

G. Blasco-Morente<sup>a,\*</sup>, S. Arias-Santiago<sup>a</sup>, I. Pérez-López<sup>a</sup> y J. Aneiros-Fernández<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Unidad de Gestión Clínica de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

<sup>b</sup> Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

Paciente de 66 años que consultó por la aparición de una lesión excrecente en forma de pico en el labio superior de 8 meses de evolución, que le ocasionaba dificultad para comer. Era un campesino, pero no había fumado ni presentaba hábito alcohólico. El examen dermatológico mostró una masa marrón, hiperqueratósica, firme de 3 cm de largo y 2 cm de diámetro en el borde del bermellón del labio superior, con la base indurada (fig. 1 A). No se encontraron adenopatías locorregionales. Se realizó extirpación quirúrgica completa de la lesión y el estudio histológico fue compatible con carcinoma epidermoide diferenciado sobre cuerno cutáneo (fig. 1B), observándose en la epidermis células epiteliales atípicas con prominente nucléolo formando nidos infiltrativos en el estroma circundante (ver asterisco). No se detectaron recurrencias ni metástasis en 2 años de seguimiento.

El principal factor de riesgo del carcinoma epidermoide es el daño solar crónico, y es frecuente que aparezca sobre áreas fotoexpuestas como cara y labio inferior, afectándose el labio superior solo en el 2-12% de los casos. El cuerno cutáneo se caracteriza por ser una lesión tumoral hiperqueratósica de aspecto cónico, asociado a diferentes



Figura 1

entidades benignas (queratosis seborreicas, verrugas vulgares), premalignas (queratosis actínicas) o malignas como el carcinoma epidermoide. Ante la duda o sospecha de lesión maligna se requiere el examen histológico mediante biopsia escisional que contenga la base de la lesión. Un adecuado diagnóstico y tratamiento del carcinoma epidermoide labial es muy importante debido a su capacidad de producir metástasis.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [gonzaloblascomorente@gmail.com](mailto:gonzaloblascomorente@gmail.com)  
(G. Blasco-Morente).